

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-7-7-82010541 D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

V.8 BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

(AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX TEL 92.41 42

ABONNEMENT ANNUEL 85 F

Régisseur de recettes de la D.D.A

C.C.P. Montpellier 5238-57

N° 13 - 1er JUILLET 1982

/ V I G N E /

EUDEMIS :

Le 2ème vol se déroule comme prévu. Les chenilles apparaissent dans certaines situations précoces où des oeufs ont été trouvés la semaine dernière. L'observation des pontes est indispensable car le suivi de leur évolution est nécessaire pour fixer la date du traitement curatif.

En situations précoces : Costières du Gard, régions de Nîmes et de Perpignan, sur le littoral, dans les secteurs de Narbonne et Ginestas (Minervois), la période la plus opportune pour l'intervention se situe vers les 3-5 juillet. Elle sera étendue progressivement aux autres zones fréquentées par ce ravageur, en fonction de la découverte des chenilles.

Pour le département de l'Hérault l'état de la situation est donné par une note spécifique.

En présence d'acariens ajouter un acaricide.

N.B. : La cochyliis et les cicadelles sont signalées dans la région d'Uzès.

BOTRYTIS :

Le bulletin n° 12 du 22 juin 1982 a fait le point sur l'évolution de la méthodologie de la lutte.

Dans le Gard, par suite des pluies et de la forte humectation de la semaine écoulée, un traitement avant la fermeture de la grappe doit être effectué sur cépages sensibles et à forte végétation.

Dans les autres départements et dans le Gard où il n'y a pas eu de pluie, le traitement n'est pas recommandé.

/ ARBORICULTURE FRUITIERE /

P O M M I E R

ZEUZERE :

Dans les vergers fréquentés par ce ravageur les dégâts sont caractérisés par des dessèchements d'extrémités des pousses. Deux à trois traitements doivent être appliqués dès maintenant à une cadence de 14 jours à l'aide d'azinphos éthyl, diéthion, feuthion, méthidathion ou phosalone.

En cas d'utilisation du mévinphos, la première application peut être retardée d'une dizaine de jours, et son renouvellement n'est à faire qu'un mois après.

Les traitements peuvent se combiner avec ceux dirigés contre le carpocapse. Dans la lutte contre le zeuzère, le volume de bouillie doit être suffisant de manière à couvrir l'ensemble de la végétation.

P 424

P O M M I E R (GARD)

MINEUSE CERCLEE : *Leucoptera scitella*.

Ce ravageur est en très nette regression actuellement.

ABRICOTIER - PECHER

OIDIUM :

Renforcer la protection après récolte.

- RECTIFICATIF -

OLIVIER

Le *Bacillus thurengensis* est homologué pour lutter contre la teigne.

/ CULTURES LEGUMIERES /

M E L O N

Renforcer la protection contre l'oïdium.
Surveillez les acariens.

- : - : - : - : - : - : -

INFORMATION DESTINEE AUX PRODUCTEURS - EXPORTATEURS
DE FRUITS FRAIS

La présence de résidus de pesticides dans et sur les fruits frais préoccupe de plus en plus certains pays importateurs.

Ainsi :

- le Canada ne tolère aucun résidu de diflubenzuron,
- certains pays européens tel que l'Irlande ont fixé la teneur maximale admise en azinphos - éthyl à 0,05 ppm (mg/kg) ce qui correspond à la limite de détection.

Aussi nous déconseillons l'utilisation de ces produits pour le traitement des fruits à destination de ces pays.

- : - : - : - : - : - : -

INFORMATION CONCERNANT LE DEPERISSEMENT DES CYPRES BLEUS,
LAMBERTS ET AUTRES RESINEUX

Les conditions climatiques de ce printemps 1982 rappellent celles de 1979 et 1980.

L'état hygrométrique très insuffisant au niveau de la frondaison est souvent la cause d'une chute spectaculaire et soudaine des brindilles ou aiguilles de certains résineux, provoquant un dégarnissement important.

Dans le cas où des pucerons ont aggravé cette chute il faut effectuer une pulvérisation de bouillie bordelaise ou bénomyl associé à du Pyrimicarbe ou oxydéméton méthyl.

Lorsqu'une attaque de cochenilles affaiblit ces arbres un oléoparathion (huile d'été) ou un méthidathion agiront aussi.

V 4

- Moyenne vallée de l'Hérault

Aspiran - Paulhan - Adissan - Gignac - Ceyras

Pas d'intervention.

St André de Sangonis

Vol en régression. Pas de nouvelles pontes. Pas de traitement complémentaire .

- Région de Pézenas

Marseillan - Vias - Roujan - Pézenas - St Thibery

Vol peu important. Peu de pontes. Pas de traitement.

- Biterrois

Montady - Puisserguier

Vol en régression. Un traitement curatif peut être appliqué dans la mesure où une intervention du type préventif n'a pas été réalisée à ce jour.

Thézan - Murviel

Un traitement curatif est à envisager dans les mêmes conditions que ci-dessus. Les zones de coteaux sont à surveiller plus particulièrement.

Sauvian - Serignan

Vol en régression. Pas d'intervention.

Cazelles

Prises moyennes. Peu de pontes.

Tirage du 1 juillet 1982 - 400 exemplaires

© Bulletin technique des Avertissements Agricoles - Montpellier 1982

7 428